

Information und Checkliste für die Hausärztin / den Hausarzt

Vor Beginn eines Studiums am Departement Gesundheit der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Winterthur sind die Studierenden verpflichtet, neben der Gesundheitsprüfung, sich nach den Impfrichtlinien für Spitalpersonal der eidgenössischen Gesundheitsdirektorenkonferenz und des BAG zu impfen. Die wichtigsten Punkte sind hier zusammengefasst.

Aus Gründen des **PatientInnen- und ArbeitnehmerInnenschutzes** müssen die obligatorischen Impfungen VOR Ausbildungsbeginn komplett sein und die gesamte Ausbildungszeit abdecken. Die abgeschlossenen Praktikumsverträge verlangen einen vollständigen Impfschutz, um ein Praktikum absolvieren zu können.

Wichtige Merkmale für Impfungen:

• **Pertussis (Keuchhusten; in Boostrix® beinhaltet):**

5 Grundimpfungen, 1. Auffrischimpfung um das 15. und 2. Auffrischimpfung um das 25. Lebensjahr (**Abstand max. 10 Jahre**).

Bei fehlender/unvollständiger Grundimmunisierung genügt eine 1-malige Auffrischimpfung im Erwachsenenalter (es muss nicht die gesamte Grundimmunisierung nachgeholt werden).

Bei Kontakt mit Säuglingen <6 Monaten (z.B. Hebammen), Schwangeren oder Risikopatienten langfristig Auffrischimpfung alle 10 Jahre.

• **Diphtherie/Tetanus (Starrkrampf):**

5 Grundimpfungen, Auffrischimpfungen im 15. und im 25. Lebensjahr, dann alle 20 Jahre

• **Poliomyelitis:**

5 Grundimpfungen; Auffrischimpfung nur bei Risikoexposition (Reisen Afrika, Asien).

• **Masern, Mumps, Röteln (MMR):**

2 Grundimpfungen oder Antikörpernachweis von Masern und Röteln.

→ Triviraten® führt zu einem ungenügenden Mumps-Impfschutz, Personen die nur mit diesem Impfstoff geimpft wurden, sollten mindestens einmalig mit MMR (Priorix®) nachgeimpft werden

• **Varizellen (Windpocken):**

Krankheit entweder anamnestisch durchgemacht oder Antikörpernachweis oder 2 Impfungen.

• **Hepatitis B:**

3 Grundimpfungen (11 bis 16-jährig 2x) mit dokumentiertem Anti-HBs-Titer > 100 IE/l 4-6 Wochen nach der dritten Impfung (resp. zweiten <16 Jahre).

Liegt die letzte Impfung mehr als 5 Jahre zurück ohne Titerbestimmung, sollte zuerst ein Booster und nach 1 Monat die Titer-Bestimmung erfolgen. Bei ungenügendem Antikörper-Titer (<100 IE/l) müssen zusätzliche Booster-Impfungen mit nachfolgender Titer-Kontrolle erfolgen.

• **Meningokokken:**

Grundimpfung 2-jährig; 2. Impfung im Alter von 11-15 Jahren (Nachholimpfung bis 20. Geburtstag). Bei fehlender Grundimmunisierung bis zum 20. Geburtstag einmalige Nachholimpfung mit quadrivalentem MCV-ACWY Impfstoff (Menveo®)

Tuberkulose:

Gemäss Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich muss bei Angestellten aller Gesundheitsberufe mit Patientenkontakt eine Testung von Tuberkulose **im Hinblick auf das zu erwartende Expositionsrisiko** durchgeführt werden.

Der früher durchgeführte Mantoux-Test ist nicht mehr verfügbar. Alternativ-Test ist ein sog. "Interferon-Gamma-Release Assay" (IGRA, entsprechend dem T-Spot-TB® oder Quantiferon®-Test).

Indikation zur Testung (T-Spot-TB® oder Quantiferon®-Test):

- Mitarbeiter mit **Migrationshintergrund** mit folgenden Kriterien:
 - Mitarbeiter < 35 Jahre PLUS
 - Herkunft aus einem Land (länger als 5 J. dort gelebt) mit hoher Tuberkulose-Prävalenz

TB-Hochendemiegebiete

- Subsahara Afrika, inkl. Äthiopien, Eritrea
- Südostasien und indischer Subkontinent inkl. Sri Lanka und Pakistan
- Afghanistan

Auf der **2. Seite** finden Sie eine **Checkliste der Impfungen** zur Hilfe bei der Überprüfung der Grundimpfungen. Bitte dieses Dokument dem Arztzeugnis beilegen.

Checkliste Impfstatus für die Hausärztin / den Hausarzt

Name/Vorname der/des Studierenden:

Bitte die notwendigen Impfungen gemäss BAG-Richtlinien durchführen und alle Impfungen und Titer-Messungen im Impfausweis eintragen.

Impfung	Firmennamen	Anzahl	Ja	Nein	Durchgeführt
Pertussis (obligatorisch)	z.B. Boostrix®	Auffrischung, wenn bei Studiumsende Impfung älter als 10 Jahre ist			→
Di-Te (empfohlen)	z.B. Boostrix®	5 Grundimpfungen + Auffrischung alle 20 Jahre			→
Poliomyelitis (empfohlen)	z.B. Boostrix Polio®, Poliorix®	5 Grundimpfungen			→
MMR (obligatorisch)	z.B. Priorix®	2 Grundimpfungen			→
Varizellen (obligatorisch)	z.B. Varilrix®	Durchgemachte Erkrankung oder 2 Grundimpfungen			→
Tuberkulose	T-Spot-TB® oder Quantiferon®-Test	Gemäss Risikobeurteilung, siehe Seite 1			→
Meningokokken (empfohlen)	z.B. Menveo®	2 Grundimpfungen (2. Lj. /11.-15. Lj.) oder bei fehlender Grundimmunisierung bis zum 20. Geburtstag einmalige Nachholimpfung			
Hepatitis B (obligatorisch)	z.B. Engerix, Twinrix (mit Hep. A kombiniert)	3 Grundimpfungen (11-16-jährig 2x)			→



Hepatitis B-Titer (> 100 IU/L lebenslanger Schutz)

Anti-HBs-Titer nach Grundimmunisierung* _____ IU/L Datum: _____

Anti-HBs-Titer < 100 IU/L → Booster I, verabreicht am: Datum: _____

Anti-HBs-Titer 4 Wochen nach Booster I _____ IU/L Datum: _____

* Falls Hepatitis B-Impfung älter als 5 Jahre ohne Titerbestimmung: zuerst 1x Booster und Titer nach 4 Wochen.

Datum:

Unterschrift und Stempel Hausärztin/Hausarzt: